ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИХ И МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПРОДУКТА ПЧЕЛОВОДСТВА

КОНАКОВА Ирина Александровна, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана

МЕДЕТХАНОВ Фазил Акберович, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана

В статье приводятся результаты исследований местно-раздражающего и аллергизирующих свойств средства на основе продукта пчеловодства. Аллергизирующие свойства препарата оценивали с помощью реакции общей анафилаксии (анафилактический шок) и активной кожной анафилаксии, местно-раздражающее действие с помощью метода накожных аппликаций. Опытным путем установлено, что изучаемое средство не вызывает анафилактического шока в реакции общей анафилаксии и не обладает анафилактическими свойствами при введении его внутрикожно в реакции активной кожной анафилаксии. Так же не оказывает раздражающего действия при местном применении.

30

АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2
2019

Введение. Развитие фармацевтического рынка является одним из основных отраслевых приоритетов государственной политики последних лет. С появлением большого количества новых лекарственных средств (ЛС) возрастает потребность в проведении доклинических и клинических исследований [5]. Для успешной регистрации ЛС ключевым этапом является разработка программы исследований, которая должна включать в себя хорошо продуманное поэтапное описание всех планируемых доклинических и клинических исследований на основании регламентирующих документов.

В настоящее время в обязательную программу доклинических исследований входит оценка аллергизирующих свойств на лабораторных животных [6].

Использование стандартных методов при изучении аллергизирующих свойств фармакологических средств, особенно вновь синтезированных, дает возможность врачам более рационально назначать лекарства и тем самым уменьшить число аллергических осложнений лекарственной этиологии. Материалы экспериментальной оценки фармакологического средства могут быть включены и в протокол клинических испытаний [7, с. 55].

Таким образом, изучение аллергизирующих свойств новых лекарственных препаратов в эксперименте на животных имеет существенное значение в связи с необходимостью всесторонней доклинической экспертизы предлагаемых новых препаратов для ветеринарной практики [1].

Целью нашей работы явилось доклиническое исследование аллергизирующих и местно-раздражающих свойств средства, созданного на основе продукта пчеловодства.

Методика исследований. Исследования проведены на беспородных мышах обоих полов массой тела 18–20 г. и белых крысах обоих полов массой 180–200 г. Местно-раздражающее действие исследуемого средства испытывали на

белых крысах, аллергизирующее действие на беспородных мышах. Всего в опыте использовано 20 крыс и 100 мышей, которых содержали предварительно в течение 14 сут. в помещении вивария для карантинных мероприятий. Самок содержали отдельно от самцов. Эксперименты проводили при строгом соблюдении требований Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей» [3] и в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» [4].

1. Аллергизирующие свойства препарата были оценены при помощи нижеперечисленных методик.

Реакция общей анафилаксии (анафилактический шок). Реакцию общей анафилаксии изучали согласно методическим указаниям [7, с. 61], где рассматриваются дозы, рекомендуемые в качестве сенсibilизирующей и разрешающей.

За сенсibilизирующую дозу согласно методике была принята доза на порядок меньше, чем LD_{50} , а именно $1/50$ от LD_{50} . В ранее проведенном опыте по изучению острой токсичности средняя смертельная доза для белых крыс средства на основе продукта пчеловодства была определена как 5 мл при массе тела 200 г., из чего следует, что на 1 кг массы тела доза препарата составила 25 мл. Исходя из этого, сенсibilизирующая доза для мышей массой тела 20 г. составила 0,01 мл.

В эксперименте по изучению реакции общей анафилаксии использовали 60 мышей, из которых были сформированы шесть групп по 10 животных в каждой в зависимости от гендерной принадлежности (самки контрольной и опытных групп, самцы контрольной и опытных групп). Сенсibilизацию подопытных животных проводили в нижепредставленной последовательности.

Первая группа самцов и самок мышей получала средство в дозе 0,01 мл, вторая – в 10 раз ее превы-

шающей – 0,1, третья группа служила контролем. Сенсибилизацию выполняли введением исследуемого препарата трехкратно парентерально: первая инъекция – подкожно, две последующие – внутримышечно. Контрольной группе мышей вводили изотонический раствор натрия хлорида в дозе 0,1 мл на животное по той же схеме. Анафилактические свойства препарата выявляли путем внутривенного его введения на 14-е сут. после последней инъекции. Внутривенное введение исследуемого средства выполняли в суммарной сенсибилизирующей дозе: 1-й группе – 0,03 мл, 2-й группе – 0,3 мл, контролю – 0,3 мл. Учет интенсивности анафилактического шока проводили в индексах по W.O. Weigle [2], где:

++++ – шок со смертельным исходом;

+++ – шок тяжелой степени (общие судороги, асфиксия, животное теряет способность удерживаться на лапах, падает на бок, не погибает);

++ – шок умеренный (небольшие судороги, выраженные явления бронхоспазма);

+ – шок слабый (некоторое беспокойство, учащенное дыхание, почесывание мордочки, непроизвольное мочеиспускание, дефекация, шерсть взъерошена);

0 – шок не развился, признаки его отсутствуют.

Активная кожная анафилаксия. В эксперименте использовали 40 мышей, из числа которых были сформированы две группы (опытная и контрольная) по 10 самок и 10 самцов в каждой.

При изучении активной кожной анафилаксии руководствовались той же методикой сенсибилизации, что и при изучении общей анафилактической реакции. На 14-е сут. опыта после последней инъекции испытуемого средства в качестве анафилактогена (сенсибилизации) на выстриженных участках спины мышам опытной группы внутрикожно вводили препарат в дозе 0,03 мл. Спустя 20 мин после инокуляции разрешающей дозы средства мышам внутривенно вводили 1%-й раствор трипановой сини в дозе 0,3 мл. Эксперимент завершали на 30 мин после внутривенного введения красителя эвтаназией животных обеих групп с помощью эфира диэтилового. Затем определяли размер синего пятна на внутренней стороне кожи, используя штангенциркуль. Животным контрольной группы сенсибилизацию проводили изотоническим раствором хлорида

натрия, дальнейший ход эксперимента аналогичен опытной группе.

2. Изучение местно-раздражающего действия.

Для оценки местно-раздражающего действия средства из продуктов пчеловодства применяли метод накожных аппликаций, в котором использовали самцов белых крыс в количестве 20 штук. Животных разделили на 2 группы: контрольную и опытную, по 10 крыс в каждой. За 1 сут. до начала эксперимента животным обеих групп выстригали участки кожи на спине размером 3х3 слева и справа от позвоночника. Исследуемое средство наносили с помощью ватно-марлевого тампона и выдерживали 4 ч. На противоположную сторону аналогичным образом наносили дистиллированную воду. Спустя 4 ч удаляли ватно-марлевый тампон и регистрировали реакцию кожи.

Раздражающее действие тестируемого объекта оценивали по наличию гиперемии, отека, болевой реакции и утолщения кожной складки в течение первых 5 ч после аппликации, а затем ежедневно в течение 14 суток.

Результаты исследований.

Реакция общей анафилаксии (анафилактический шок). При изучении аллергизирующих свойств испытуемого средства была отмечена однотипность ответных реакций подопытных животных в реакции общей анафилаксии вне зависимости от их половой принадлежности. В связи с этим приведенные ниже результаты исследований являются обобщенными независимо от половой принадлежности мышей.

Опытным путем установлено, что применение средства на основе продукта пчеловодства при предварительной сенсибилизации не вызывает анафилактического шока у подопытных мышей при внутривенном использовании его как в суммарно сенсибилизирующей дозе, так и в десять раз ее превышающей, которые принято считать в качестве разрешающей (табл. 1). При этом индекс по Wiegle равен 0, т.е. реакции шока отсутствуют.

Активная кожная анафилаксия. При изучении реакции активной кожной анафилаксии установлено, что средство на основе продукта пчеловодства не приводит на месте инъекции к нарушению структуры кожи с реактивными изменениями. Отмечено, что использование пре-

Таблица 1

Результаты выявления аллергизирующих свойств в реакции общей анафилаксии

Группа	Доза препарата при сенсибилизации, мл/гол.	Разрешающая доза препарата, мл/гол.	Количество животных в опыте		Пало, гол.
			в начале	в конце	
Контроль самки	–	0,3	10	10	0
1-я – опытная – самки	0,01	0,03	10	10	0
2-я – опытная – самки	0,1	0,3	10	10	0
Контроль самцы	–	0,3	10	10	0
1-я – опытная – самцы	0,01	0,03	10	10	0
2-я – опытная – самцы	0,1	0,3	10	10	0

парата в разрешающей дозе на пике иммунных реакций не приводит к превышению размера «пуговики» по отношению к значениям, приведенных в методических указаниях (табл. 2). В то же время эти значения у самок были в 1,8 раза выше показателей контрольных мышей, которым использовали изотонический раствор хлорида натрия, а у самцов – в 1,6 раза, но они не превышали 6 мм, что свидетельствует об отрицательной реакции кожи на введенное средство и характеризует его как не обладающее анафилактическими свойствами.

Таблица 2

Результаты выявления аллергизирующих свойств в реакции активной кожной анафилаксии ($M \pm m$)

Группа	Размер окрашенной пуговики на 14-е сут., мм
Контрольная – самки	1,56±0,03
Опытная – самки	2,8±0,51
Контрольная – самцы	1,65±0,14
Опытная – самцы	2,73±0,46

Примечание: уровни достоверности, соответственно $p \geq 0,05$.

Местно-раздражающее действие. При изучении раздражающего действия на белых крысах на протяжении всего опыта состояние животных обеих групп было удовлетворительное.

Осмотр показал, что на выстриженных участках кожи крыс обеих групп отсутствуют гиперемия и отек подлежащих тканей. Пальпацией отмечено отсутствие болевой реакции, а с помощью штангенциркуля определено, что кожная складка не утолщена. Таким образом, можно сделать вывод о том, что однократная аппликация исследуемого нами средства с помощью ватно-марлевого тампона не вызывает функциональных и структурных нарушений со стороны кожи и тканей.

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что исследуемый нами препарат на основе продукта пчеловодства не обладает аллергизирующими свойствами, что доказано в реакциях общей и местной анафилаксии. Также не вызывает на-

рушений со стороны кожного покрова при наружном применении, что свидетельствует об отсутствии у средства раздражающего действия. В перспективе предстоит патентование препарата и присвоение ему официального названия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курочкина К.Г. Изучение аллергизирующих свойств нового противопаразитарного препарата // Теория и практика паразитарных болезней животных. – 2010. – № 11. – С. 255 – 258.
2. Методические рекомендации. Оценка аллергизирующих свойств фармакологических средств № 981300 / сост. Б.И. Любимов [и др.]. – Режим доступа: www.alppr.ru.
3. О защите животных от жестокого обращения: [Федер. закон принят Гос. Думой 1 янв. 1997]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/document/>.
4. О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных: приказ Минздрава СССР от 12.08.1977. – № 755. – М., 1977. – 7 с.
5. Панков И.Ю., Семиволос А.М., Козлов С.В. Влияние препарата «Митрек» на морфологические и биохимические показатели крови коров // Аграрный научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 15–20.
6. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. I / под ред. А.Н. Миронова. – М.: Гриф и К, 2012. – 994 с.
7. Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / под общ. ред. Р.У. Хабриева. – 2 изд., перераб. и доп. – М. Медицина, 2005. – 832 с.

Конакова Ирина Александровна, аспирант кафедры «Эпизоотология и паразитология», Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. Россия.

Медетханов Фазил Акберович, д-р биол. наук, доцент кафедры «Фармакология, токсикология и радиобиология», Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. Россия. 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 35. Тел.: (8432) 273-96-46.

Ключевые слова: аллергизирующее свойство; мыши; продукт пчеловодства; местно-раздражающее действие; крысы.

THE STUDY OF ALLERGENIC AND LOCAL IRRITATING PROPERTIES OF THE PRODUCTS BASED ON BEE PRODUCTS

Konakova Irina Alexandrovna, Post-graduate Student of the chair "Epizootology and Parasitology", Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman. Russia.

Medetchanov Fazil Akberovich, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor of the chair "Pharmacology, Toxicology and Radiobiology", Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman. Russia.

Key words: allergenic property; mice; beekeeping product; local irritant effect; rats.

The article presents the results of studies of locally irritating and allergic properties of the product based on the bee-farming products. Allergizing properties of the drug were assessed by the reaction of general anaphylaxis (anaphylactic shock) and active cutaneous anaphylaxis, a local irritant effect was assessed by skin application method. Experience has shown that the drug studied does not cause anaphylactic shock in the reaction of general anaphylaxis and does not have anaphylactogenic properties when administered intracutaneous in the reaction of active cutaneous anaphylaxis. It also does not have irritating effects when applied topically.