ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ НА ОРОШАЕМЫХ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ СУХОЙ СТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

ПРОНЬКО Виктор Васильевич, Научно производственное объединение «Сила жизни»

ПРОНЬКО Нина Анатольевна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

РОМАНЕНКОВ Владимир Аркадьевич, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

РУХОВИЧ Ольга Владимировна, Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова

БЕЛИЧЕНКО Майя Валериевна, Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова

ЯРОШЕНКО Татьяна Михайловна, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Юрьевич, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

КЛИМОВА Надежда Федоровна, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

Представлен обзор агрохимических исследований, выполненных на орошаемых светло-каштановых и бурых полупустынных почвах Саратовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Отмечено, что в стационарных опытах, проведенных в указанных регионах, изучалось влияние длительного применения минеральных удобрений на трансформацию агрохимических свойств и продуктивность севооборотов различной специализации. В многочисленных краткосрочных опытах определены оптимальные виды, дозы и сроки внесения минеральных удобрений при возделывании зерновых (яровая и озимая пшеницы, кукуруза и сорго на зерно), зернобобовых (соя, нут), кормовых (суданская трава, сахарное сорго, люцерна, злаковые смеси на лимахах), технических (рыжик, горчица) и овощных (томаты, лук репчатый) культурах.

Введение. В Поволжье светло-каштановые засоленные и солонцеватые, а также сходные с ними по агрохимическим свойствам бурые полупустынные почвы занимают южную часть зоны сухих степей [1]. Они широко представлены в Саратовской (1,085 млн га), Волгоградской (3,137 млн га), Астраханской (908 тыс. га) областях и в Республике Калмыкия (1,450 млн га). Общими чертами для этих почв являются неудовлетворительные агрофизические, водно-физические свойства, высокие карбонатность и концентрация водорастворимых солей [3, 15, 30, 40]. Устойчивое ведение земледелия на светло-каштановых и бурых полупустынных почвах возможно только в условиях орошения [2, 38].

Следует особо отметить, что в начале XX века среди специалистов преобладало мнение о том, что в зоне сухих степей применение удобрений даже в условиях орошения будет неэффективным и даже вредным. Основывалось оно на высоком содержании в почвах токсичных для растений солей натрия, хлора и сульфатов. Опровергнуть эти взгляды помогли результаты Аршань-Зельменского стационара. Он был открыт в 1931 г. на территории Республики Калмыкия по инициативе профессора МГУ А.Н. Лебеяднцева, который в то время был заместителем руководителя Географической сети опытов с удобрениями в СССР.

Было показано, что в условиях орошения рассолению верхнего слоя почвы способствуют посевы люцерны [4], однолетних трав [29], а также внесение навоза и азотно-фосфорных удобрений в сочетании с глубокими обработками почвы [30]. Высокая результативность отмеченных агромероприятий нашла свое подтверждение и в последующих исследованиях, выполненных на светло-каштановых почвах Саратовской [9, 31] и Волгоградской областей [11, 23, 33].

В начале семидесятых годов прошлого века в зоне сухих степей Поволжья началось широкое мелиоративное строительство. Оно сопровождалось резким увеличением поставок минеральных удобрений в данный регион. Оба эти обстоятельства способствовали расширению почвенных и агрохимических исследований на светло-каштановых и бурых полупустынных почвах.

Результаты исследований. В Саратовской области на Малоузенской опытной станции в начале 80-х гг. XX века на орошаемой светло-каштановой почве начали изучать приемы оптимизации систем удобрения в зернокармном севообороте [21]. По результатам проведенных исследований для орошаемых светло-каштановых тяжело-суглинистых почв Саратовского Заволжья разработаны системы удобрения, обеспечивающие продуктивность полевого зернокармного сево-

оборота 50–60 ц/га з.е. в год. Установлено, что в условиях орошения при средней обеспеченности почвы подвижным фосфором, повышенной и высокой – калием и содержании гумуса в слое 0–30 см 2,35–2,64 % азот является главным фактором, определяющим величину и качество урожая зерновых колосовых культур и кукурузы.

Эффективность фосфорных удобрений при исходном содержании подвижного фосфора в почве, равном 18–27 мг/кг не превышала 3–16 % и проявлялась лишь в отдельные годы, как правило, на фоне азота.

Наличие в севообороте 33 % люцерны и внесение минеральных удобрений среднегодовыми дозами $N_{60-90}P_{80}$ способствовало повышению плодородия почвы. К концу 12-го года исследований в пахотном слое почвы 0–30 см содержание гумуса возросло до 2,83–2,86 %. По содержанию подвижного фосфора почва перешла в группу с повышенным содержанием P_2O_5 (47–67 мг/кг). Несмотря на отрицательный баланс K_2O в почве, содержание подвижного калия в ней оставалось высоким (490–520 мг/кг) [21].

На основании результатов, полученных в стационарных опытах, были внесены существенные дополнения в практические рекомендации по применению удобрений на орошаемых землях Поволжья. По мнению ведущих агрохимиков России, они не потеряли своей актуальности и в настоящее время [25].

Волжским НИИ гидротехники и мелиорации изучались приемы восстановления продуктивности земель лиманного орошения в полупустынной зоне Саратовского Заволжья.

Установлено, что на деградированных лиманах, содержащих в составе травостоя 28–30 % злаковых трав, проведение только подкормки азотными удобрениями в дозе N_{60} в расчете на формирование урожайности сена 3 т/га малоэффективно из-за сильной угнетенности злаковых трав и слабой аэрации верхних слоев почвы. Этот прием в прямом действии и на следующий год в последствии обеспечивает повышение урожайности сена с 1,3 до 1,9–2,0 т/га.

В то же время поверхностное улучшение деградированного травостоя дискованием в 2 следа на глубину 5–7 см и азотной подкормкой трав в системе комплексной мелиорации естественных лиманов повышает их продуктивность в год обработки до 3,24 т/га сена, или в 2,4 раза, а на второй год в последствии – 2,98 т/га с суммарной прибавкой урожая сена 3,48 т/га. Затраты оросительной воды на 1 т сена снижаются до 926–1006 м³, или в 2,2–2,4 раза [41].

В краткосрочных опытах на светло-каштановых почвах Саратовского Заволжья большое

внимание уделялось удобрению яровой пшеницы. Основной упор в этих исследованиях делали на определение оптимальных доз азота и фосфора для данной культуры. Изучали также их влияние на качество зерна. Проводили наблюдения за пищевым режимом почвы [44]. Накопленные сведения позволили разработать диагностику питания орошаемых зерновых культур и обосновать оптимальные дозы удобрений [5, 26, 39].

На орошаемых светло-каштановых засоленных и солонцеватых почвах юго-восточной части Саратовской области разрабатывались системы удобрений для зернового сорго [16] и суданской травы [37]. Для этих культур были установлены оптимальные дозы азотных и фосфорных удобрений, а также нормативы затрат элементов питания на формирование единицы продукции.

В Волгоградской области большую работу на орошаемых светло-каштановых почвах Волго-Донского междуречья выполнил Всероссийский НИИ орошаемого земледелия (ВНИИОЗ). Сотрудниками института дана обстоятельная агрохимическая характеристика орошаемых почв Поволжья и других регионов СССР [35]. В этом учреждении разработаны научные основы программированного возделывания сельскохозяйственных культур [27, 42]. Указанная технология базируется, в том числе, на рациональном использовании минеральных удобрений.

ВНИИОЗ внес неоценимый вклад в обоснование необходимости возделывать на орошаемых почвах сухой степи такие новые на тот период времени (2-я половина XX века) культуры – кукурузы на зерно [28, 32] и сои [13, 24]. В многолетних экспериментах были выявлены перспективные сорта и гибриды этих культур, установлены оптимальные режимы орошения и рациональные виды, дозы, сочетания и сроки внесения минеральных удобрений.

Усилия агрохимиков Волгоградского СХИ (ныне Волгоградский ГАУ) во 2-ой половине XX века были направлены на разработку систем удобрения орошаемых зерновых культур. В опытах с яровой [34] и озимой [36] пшеницами показано, что в повышении урожайности зерна и улучшения его качества на светло-каштановых почвах принадлежит азоту. Такие же результаты были получены и в более поздних исследованиях с зерновым сорго [20].

В последние годы исследователи Волгоградского ГАУ стали проявлять интерес к проведению комплексных исследований в условиях орошения.

При изучении режимов орошения и удобрения перспективных сортов озимой пшеницы на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья установлено, что применение режимов орошения 60, 70 и 80 % НВ без применения удобрений

позволило получить урожай от сортов Донщина – 4,0; 4,5; 4,6 т/га, Дон 95 – 4,4; 4,6 и 4,8 т/га, Новинка 5 – 4,0; 4,3 и 4,5 т/га соответственно. Эти показатели урожайности у вышеуказанных сортов были в 1,8–2,1 раза больше по сравнению с контролем без удобрения и орошения.

Взаимное влияние режимов орошения с дозами минеральных удобрений способствовало не только дальнейшему росту урожайности зерна у сортов Донщина до 4,6–6,4 т/га, Дон 95 до 4,9–6,9, Новинка 5 до 4,4–6,3 т/га, но и возмещению выноса питательных веществ с их урожаем из почвы [22].

В настоящее время в Волгоградской области активизировались научные исследования с овощными культурами.

В Волгоградском ГАУ изучалась эффективность совместного применения сухого птичьего помета и минеральных удобрений при возделывании томата на мелиорированных каштановых и пойменных почвах Волгоградской области в условиях орошения дождеванием. Установлено, что рациональное применение куриного сухого подстилочного помета (СПП) и минеральных удобрений позволяет целенаправленно воздействовать на питательный режим мелиорированных почв, существенно повышая в корнеобитаемом слое содержание подвижных форм фосфора, калия и азота ко времени высадки рассады и в последующие фазы роста и формирования урожая томата [43].

Авторы пришли к выводу, что внесение изучаемых доз сухого куриного помета и минеральных удобрений, увеличивая содержание питательных веществ в почве, обеспечивает повышение концентрации NPK в биомассе, увеличивает потребление и общий вынос NPK урожаем.

Изучение технологии капельного орошения и удобрения перспективных гибридов репчатого лука в зоне сухих степей Нижнего Поволжья, проведенных Волгоградским комплексным отделом ВНИИГИМ и Волгоградским ГАУ, показало, что для формирования урожайности лука на уровне 80 т/га требуется вносить $N_{90}P_{80}K_{30}$ и проводить 18–24 поливов по 160–250 м³/га. Для формирования урожайности лука на уровне 100 т/га требуется при внесении удобрений дозой $N_{150}P_{105}K_{120}$ проводить 20–25 поливов по 160–250 м³/га. Для формирования урожайности лука на уровне 100–120 т/га требуется в сочетании с внесением удобрений дозой $N_{210}P_{130}K_{210}$ поддерживать порог предполивной влажности почвы на уровне 80 % НВ в период «образование 5-го листа – техническая спелость» или в течение вегетационного периода, что обеспечивается проведением 23–26 поливов по 160–250 м³/га [10].

В последние годы на орошаемых каштановых почвах Поволжья помимо распростра-

ненного способа полива дождеванием расширяется использование внутрпочвенного капельного орошения, который используют в основном для возделывания овощных культур и картофеля.

По данным Волгоградского филиала ВНИИГИМ сочетание оптимального водного режима почвы и уровня минерального питания при капельном орошении на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья обеспечивает возможность получения до 90 т/га лука [18]. Увеличение дозы минеральных удобрений в пределах $N_{50}P_{35}K_{10} - N_{230}P_{110}K_{280}$ при повышении уровня предполивной влажности почвы с 70 до 80–90 % НВ позволяет в 1,8 раза увеличить динамику накопления надземного органического вещества за счет повышения фотосинтетического потенциала посева (на 66 %) и активизации фотосинтетической активности.

В Республике Калмыкия активные агрохимические исследования начали разворачиваться в послевоенный период. Вначале они были привязаны к разработке приемов окультуривания солонцовых почв и их можно рассматривать как продолжение работ, начатых на Аршань-Зельменском стационаре. Результаты этих опытов убедительно показали, что применение удобрений на почвах Калмыкии должно сочетаться с проведением химических и агробиологических мелиораций [30, 40].

Было установлено, что на орошаемых светло-каштановых солонцеватых почвах ведущая роль в повышении урожайности зерновых культур принадлежит азоту. Фосфорные удобрения в чистом виде дают прибавки урожая, но они заметно ниже, чем от азота [17]. Калийное удобрение как в чистом виде, так и в сочетании с азотно-фосфорными малоэффективно [12].

В последние годы в Республике Калмыкия выполнена целая серия исследований под руководством В.В. Бородычева. Так, при изучении технологии возделывания нута на бурых почвах рисовых чеков Калмыкии установлено, что на формирование урожая зерна нута вода расходуется наиболее эффективно (1569 м³/га) при проведении посева в ранние сроки – 11 апреля и при сочетании операции внесения удобрений с плоскорезной обработкой почвы на глубину 30 см. Переход с дискования на плоскорезную обработку почвы и удобрение нута в ранних посевах (11–21 апреля) сопровождается увеличением суммарного водопотребления на 110–240 м³/га, а при посеве 1–11 мая – на 10–140 м³/га. Однако влияние этих факторов на водный режим почвы в 3,5–5,4 раза меньше, чем влияние срока посева и складывающихся метеоусловий [7].

При совершенствовании технологии возделывания суданской травы на сено на бурых по-

лупустынных почвах Калмыкии установлено, что наиболее эффективно на формирование урожая оросительная вода расходовалась на участке, где минеральные удобрения вносили дозой $N_{120}P_{100}$ кг/га д.в. и поддерживали влажность почвы на уровне 75–80 % НВ – 341 м³/т продукции в среднем за три года.

Прибавка урожайности сена за счет применения минеральных удобрений составила за годы исследований при поливе 65–70 % НВ на варианте $N_{60}P_{40}$ – 1,88–4,10 т/га, или 23–34 %, на варианте $N_{80}P_{60}$ – 3,41–6,83 т/га, или 45–70 %, на варианте $N_{120}P_{100}$ – 4,75–6,83 т/га, или 64–84 %. При поддержании предполивной влажности почвы на уровне 75–80 % НВ прибавка по вариантам внесения минеральных удобрений составила: $N_{60}P_{40}$ – 2,04–4,35 т/га, или 27–41 %, $N_{80}P_{60}$ – 4,98–9,93 т/га, или 67–94 %, $N_{120}P_{100}$ – 7,33–10,74 т/га, или 57–103 % [14].

Изучение усовершенствованной технологии возделывания сахарного сорго на зеленую массу на бурых, малогумусовых почвах в рисовых чеках Калмыкии показало, что усиление эвапотранспирации посевами сахарного сорго в период «всходы – кущение» сопровождается снижением доступности почвенной влаги в фазы «выход в трубку – выметывание» и «выметывание – молочная спелость».

Наибольшая урожайность зеленой массы сорго 32,5–33,4 т/га при дозе внесения $N_{80}P_{50}$ обеспечивается формированием чистой продукции фотосинтеза в среднем 6,5–8,1 г/м² в сутки, что позволяет посевам накапливать в среднем 9,74–10,02 кг/га сухого вещества в сутки в течение вегетационного периода [8].

Имеется несколько интересных работ, выполненных в острозасушливых условиях, где возделываемые культуры используют остаточную почвенную влагу рисовых чеков. В этих условиях при изучении агротехнических приемов возделывания горчицы сарептской установлено, что формирование оптимальной густоты посевов обеспечивает реализацию потенциала продуктивности горчицы в рисовых чеках.

Наибольший урожай маслосемян горчицы сарептской формируется при высева семян по мерзло-талой почве нормой высева семян 2,4 млн шт./га на фоне внесения минеральных удобрений $N_{110}P_{80}$.

Экономическое целесообразно возделывание горчицы сарептской в рисовых чеках посевом по мерзло-талой почве нормой высева семян 2,4 млн шт./га с внесением минеральных удобрений дозами $N_{70}K_{50}$. Такое сочетание факторов обеспечивает максимальный (1,95) индекс доходности затрат, внутренняя норма доходности потенциальных проектов составляет

117,9 % и чистый дисконтированный доход с 1 га – 21892 руб. [6].

При совершенствовании технологии возделывания ярового рыжика в рисовых севооборотах на бурых почвах Калмыкии установлено, что одним из основных условий успешного возделывания данной культуры в рисовых чеках является создание условий рационального расходования воды в течение вегетационного периода при оптимизированной площади питания и внесении минеральных удобрений.

Масличность семян рыжика в рисовых чеках изменяется в пределах 35,5–38,6 % и снижается при повышении уровня минерального питания и нормы высева на 0,1–1,8 %. Валовой сбор рыжикового масла возрастает с 413 кг/га при посеве нормой 6 млн сем./га на фоне естественного плодородия почвы до 660 кг/га при посеве с нормой высева семян 8 млн шт./га в сочетании с внесением полного минерального удобрения $N_{40}P_{50}K_{25}$ [19].

Заключение. В зоне светло-каштановых и бурых полупустынных почв сухой степи Поволжья агрохимические исследования начались в тридцатых годах прошлого века. Их научное и организационное становление происходило при непосредственном участии Географической сети опытов с удобрениями СССР и ее головной организации – ВИУА им. Д.Н. Прянишникова. Большую роль в изучении эффективности удобрений в сухостепной зоне сыграло открытие Аршань-Зельменского стационара в 1931 г. (Республика Калмыкия). Было показано, что органические (навоз, сидераты) и минеральные удобрения оказывают положительное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур на засоленных и солонцовых почвах при условии их мелиоративного улучшения. В последующий период времени в длительных стационарных и краткосрочных опытах изучалось влияние различных систем удобрений на агрохимические свойства орошаемых светло-каштановых и бурых полупустынных почв Поволжья. Установлены оптимальные виды, дозы, сроки и способы внесения удобрений под зерновые, кормовые, технические и овощные культуры, возделываемые в этой зоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агрохимическая характеристика почв СССР. – Т.6 (районы Поволжья). – М.: Наука, 1966. – 322 с.
2. Антипов-Каратаев И.Н., Филиппова В.Н. Влияние длительного орошения на процессы почвообразования и плодородия почв степной полосы Европейской части СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 206 с.
3. Антипов-Каратаев И.Н. Комплексный метод изучения физических, химических и агрохимических свойств почв Заволжья в связи с орошением // Проблемы Волго-Каспия. – М.: Изд-во АН СССР, 1934. – С. 497–535.

4. Бирюкова А.П. К вопросу о скорости естественного расселения почвы // Почвоведение. – 1942. – № 7. – С. 15–25.
5. Болдырев Н.К., Азовцева Т.В., Казарницкая В.А. Диагностика питания орошаемых зерновых культур в зоне светло-каштановых почв Волгоградской области // Бюлл. Геосети ВИУА. – 1990. – № 98. – С. 76–79.
6. Бородычев В.В., Адыев С.Б., Левина А.В. Водный режим и продуктивность горчицы сарептской в рисовых чеках // Плодородие. – 2011. – № 1. – С. 11–13.
7. Бородычев В.В., Подольская Т.В., Ляконосова И.А. Возделывание нута в рисовых чеках // Плодородие. – 2008. – № 6. – С. 31–32.
8. Бородычев В.В., Ракитина Н.В. Минеральное питание и продуктивность сахарного сорго // Плодородие. – 2013. – № 3. – С. 36–37.
9. Васильева С.Г., Изотов В.И. Влияние удобрений на накопление корневой массы люцерны на светло-каштановых почвах Заволжья // Эффективность удобрений на орошаемых и осушаемых землях: сб. науч. тр. – М., 1977. – С. 101–103.
10. Выборнов В.В., Губаюк Ю.Д. Режимы капельного орошения и удобрение репчатого лука // Плодородие. – 2007. – Прил. к № 4. – С. 50–51.
11. Гаврилов А.М. Интенсивное использование орошаемых земель. – М.: Колос, 1971. – 190 с.
12. Грищенко Ю.Г., Рубижный А.Н. Влияние минеральных удобрений на урожай озимой пшеницы Безостая 1 в условиях Калмыцкой АССР // Химия в сельском хозяйстве. – 1972. – № 2. – С. 13–14.
13. Даниличев С.Н. Отзывчивость сортов сои на минеральное питание при различных режимах орошения // Возделывание люцерны и сои в Нижнем Поволжье. – Волгоград, 1983. – С. 135–144.
14. Дедова Э.Б., Кониева Г.Н., Кравченко Е.А. Рост, развитие и продуктивность сена суданской травы в Калмыкии // Актуальные вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве: материалы Междунар. науч. конф. – Владикавказ, 2012. – С. 209–211.
15. Делинкайтис С.А. Краткий обзор состояния, работ и перспектив Валуйской мелиоративной станции им. П.А. Костычева (1894–1929). – Покровск, 1930. – 185 с.
16. Дерябин В.Н. Оптимизация минерального питания сорго сахарного на орошаемой светло-каштановой почве Саратовского Заволжья: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. – Саратов, 2000. – 18 с.
17. Джиджиков В.Н., Степанец И.Т. Эффективность минеральных удобрений на каштановых почвах Калмыкии // Агрохимия. – 1971. – № 11. – С. 144–146.
18. Дубенок Н.Н., Богданенко М.П., Выборнов В.В. Орошение и удобрение репчатого лука при возделывании рассадным способом в ранней культуре // Плодородие. – 2011. – № 6. – С. 33–34.
19. Дубина Е.А. Продуктивность рыжика масличного в рисовых чеках // Агрохимический вестник. – 2011. – № 1. – С. 38–39.
20. Жидков В.М., Жариков Е.М. Водный и питательный режим почвы при выращивании сорго на зерно в Нижнем Поволжье // Кукуруза и сорго. – 1998. – № 3. – С. 14–16.
21. Конончук В.В. Оптимизация системы удобрений в зернокармном севообороте на светло-каштановой почве Поволжья при орошении: автореф. дисс. ... д-ра с.-х. наук. – М., 2004. – 36 с.
22. Коротков А.А. Режимы орошения и удобрение перспективных сортов озимой пшеницы на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. – Саратов, 2007. – 18 с.
23. Медведев Г.А., Чурзин В.Н. Люцерна в интенсивных севооборотах и ее роль в повышении плодородия светло-каштановых почв Нижнего Поволжья // Повышение плодородия орошаемых почв при интенсивном использовании. – Волгоград, 1989. – С. 86–92.
24. Мелихов В.В., Ушакова Е.В. Возделывание сои при капельном орошении в условиях Нижнего Поволжья // Плодородие. – 2013. – № 5. – С. 19–21.
25. Минеев В.Г. Развитие агрохимических исследований и практика химизации земледелия в Поволжье // Материалы Регионального совещ. Геосети опытов с удобрениями в Поволжье. – Казань, М.: ВНИИА, 2014. – С. 3–19.
26. Научные основы использования удобрений в орошаемом земледелии / под общ. ред. Е.И. Столыпина. – Волгоград: ВНИИОЗ, 1979. – 112 с.
27. Оптимизация водного режима почвы при программировании урожая в орошаемом земледелии: сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. – Волгоград: НПО «Орошение», 1989. – 176 с.
28. Оптимизация условий возделывания кукурузы на орошаемых землях: сб. науч. тр. – Волгоград, 1986. – 141 с.
29. Пак К.П. Роль сидеральных культур в мелиорации солонцов // Земледелие. – 1958. – № 10. – С. 19–22.
30. Пак К.П. Солонцы СССР и пути повышения их плодородия. – М.: Колос, 1975. – 383 с.
31. Пронько Н.А., Романова Л.Г., Фалькович А.С. Изменение плодородия орошаемых каштановых почв Поволжья в процессе длительного использования и научные основы его регулирования. – Саратов: Изд-во Саратовского ГАУ, 2005. – 220 с.
32. Пустовой И.В., Капустина Т.Ф. Эффективность удобрений под кукурузу на светло-каштановых почвах Волгоградской области при орошении // Агрохимия. – 1969. – № 12. – С. 74–81.
33. Радов А.С., Москвичев Ю.А. Система промежуточного зеленого удобрения под картофель на светло-каштановых почвах Волгоградской области при орошении // Тр. Волгоградского СХИ. – 1968. – Т. 28. – С. 41–48.
34. Радов А.С., Попов В.Я. Удобрения яровой пшеницы при орошении на светло-каштановых почвах Волгоградской области // Агрохимия. – 1969. – № 2. – С. 39–41.
35. Радов А.С., Столыпин Е.И. Удобрение в орошаемом земледелии. – М.: Наука, 1978. – 390 с.
36. Реброва Г.И. Влияние минеральных удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы при орошении в условиях светло-каштановых почв Волгоградской области: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. – Волгоград, 1978. – 22 с.
37. Рыжов А.Н. Оптимизация минерального питания суданской травы на орошаемой светло-каштановой почве Саратовского Заволжья: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. – Саратов, 2001. – 20 с.
38. Садовников И.Ф. Почвы Южного Заволжья как объект орошения. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 491 с.
39. Система применения удобрений на орошаемых

землях Поволжья и Северного Кавказа: рекомендации. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 64с.

40. Степанец И.Т., Джиджиков В.Н., Шаронов Б.Д. Почвы Калмыкии и пути их освоения. – Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1972. – 66 с.

41. Туктаров Р.Б. Агроэкологический мониторинг и приемы восстановления продуктивности земель лиманного орошения в полупустынной зоне Саратовского Заволжья: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. – Саратов, 2009. – 23 с.

42. Филин В.И. Биологические и технологические основы программированного возделывания сельскохозяйственных культур при орошении в зоне сухих степей Нижнего Поволжья: автореф. дисс. ... д-ра с.-х. наук. – Саратов, 2000. – 46 с.

43. Филин В.И., Кривошеин М.И. Система удобрения томата на каштановых почвах Волго-Донского междуречья // Плодородие. – 2007. – Прил. к № 2. – С. 27–28.

44. Эффективность удобрений на орошаемых и осушаемых землях // Бюлл. Географ. сети опытов с удобрениями. – Вып. 36. – М.: ВИУА, 1977. – 105 с.

Пронько Виктор Васильевич, д-р с.-х. наук, проф., зав. отделом науки и развития, Научно производственное объединение «Сила жизни». Россия.

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239.

Тел.: 89271500518; e-mail: viktor-pronko@mail.ru.

Пронько Нина Анатольевна, д-р с.-х. наук, проф., кафедры «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование», Саратовский государственный

аграрный университет имени Н.И. Вавилова. Россия.

410012, г. Саратов, ул. Советская, 60.

Тел.: (8452) 73-64-12.

Романенков Владимир Аркадьевич, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Россия.

119992, г. Москва, Ленинские горы, 1, стр. 12.

Тел.: (8495) 939-10-00.

Рухович Ольга Владимировна, д-р биол. наук, зав. лабораторией, Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. Россия.

Беличенко Майя Валериевна, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник, Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. Россия.

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 39А.

Тел.: (8499) 976-37-98.

Ярошенко Татьяна Михайловна, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». Россия.

Журавлев Дмитрий Юрьевич, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». Россия.

Климова Надежда Федоровна, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». Россия.

410010, г. Саратов, ул. Тулайкова, 7.

Тел.: (8452) 64-76-88; e-mail: zhuravlevd14@yandex.ru.

Ключевые слова: орошение; Поволжье; светло-каштановые и бурые почвы; удобрения; зерновые, кормовые, технические и овощные культуры.

EFFICIENCY OF FERTILIZERS ON IRRIGATED LIGHT CHESTNUT SOILS OF THE DRY STEPPE OF THE VOLGA REGION (ANALYTICAL REVIEW)

Pronko Viktor Vasilievich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department of Science and Development, Research and Production Association "Sila zhizni", Russia.

Pronko Nina Anatolyevna, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the chair "Engineering Surveys, Environmental Management and Water Use", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Romanenkov Vladimir Arkadievich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the chair, Moscow State University named after M.V. Lomonosov. Russia.

Rukhovich Olga Vladimirovna, Doctor of Biological Sciences, Head of the Laboratory, All-Russian Research Institute of Agrochemistry named after D.N. Pryanishnikov. Russia.

Belichenko Maya Valerievna, Candidate of Biological Sciences, Leading Re-searcher, All-Russian Research Institute of Agrochemistry named after D.N. Pryanishnikov. Russia.

Yaroshenko Tatyana Mikhailovna, Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher, Research Institute of Agriculture of the South-East. Russia.

Zhuravlev Dmitry Yuryevich, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Re-searcher, Research Institute of Agriculture of the South-East. Russia.

Klimova Nadezhda Fedorovna, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Re-searcher, Research Institute of Agriculture of the South-East. Russia.

Keywords: irrigation; Volga region; light chestnut and brown soils; fertilizers; grain; fodder; industrial and vegetable crops.

The article provides an overview of agrochemical studies carried out on irrigated light chestnut and brown semi-desert soils of the Saratov, Volgograd regions and the Republic of Kalmykia. It is noted that in stationary experiments carried out in these regions, the influence of long-term use of mineral fertilizers on the transformation of agrochemical properties and the productivity of crop rotations of various specializations was studied. In numerous short-term experiments, the optimal types, doses and timing of mineral fertilizers were determined for the cultivation of cereals (spring and winter wheat, corn and sorghum for grain), legumes (soybeans, chickpeas), forage crops (Sudan grass, sugar sorghum, alfalfa, cereal mixtures for estuaries), technical (camelina, mustard) and vegetable (tomatoes, onions) crops.