ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «BIOPLUS YC» И ПРЕБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «КОРМОМИКС МОС» НА РАЗВИТИЕ И МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

САМАЕВА Ксения Алексеевна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

БИРЮКОВ Олег Игоревич, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Представлены результаты использования пробиотического препарата «BioPlus YC» и пребиотического препарата «Кормомикс МОС» при выращивании баранчиков ставропольской породы до 8-месячного возраста. Установлено их положительное влияние на прирост живой массы и мясную продуктивность.

Введение. Повышение продуктивности животных – актуальная задача зоотехнической науки. В настоящее время перспективным направлением является включение в состав рационов препаратов пробиотического, пребиотического и симбиотического действия, которые положительно влияют на биоценоз кишечника и соответственно на развитие, сохранность и продуктивность животных. Одни из таких препаратов – «BioPlus YC» (пробиотик), «Кормомикс МОС» (пребиотик) и их смесь, сочетающая в себе свойства симбиотика.

Доказано, что при совместном применении пробиотиков и пребиотиков возникает синергетический эффект, который достигается за счет повышения (в 1,5–2 раза) скорости размножения полезных бактерий, способствующий усилению закрепления пробиотиков в кишечнике, а также увеличению скорости доставки пробиотиков к месту назначения [1, 2]. В научной литературе имеется обширная информация об эффективном применении про- и пребиотических препаратов при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных [3–7].

Целью нашей работы было изучение воздействия пробиотического препарата «BioPlus YC» и совместного воздействия пробиотического препарата «BioPlus YC» с пребиотическим препаратом «Кормомикс МОС» на рост, развитие и мясную продуктивность ягнят ставропольской породы до 8-месячного возраста.

Методика исследований. Для проведения опыта в период окота были сформированы три группы маток с баранчиками в возрасте 30 суток. Ягнят отбирали по методу аналогов, по 20 голов в каждой группе. Группа I являлась контрольной, группы II и III – опытными.

Основным кормом баранчиков в данный период являлось материнское молоко, для приучения к грубым кормам давали люцерновое сено и дерть ячменную по 50 г на 1 голову в сутки.

Пробиотический препарат «BioPlus YC» содержит в своем составе бактерии *Bacillus licheniformis*, штамм DSM 5749 и *Bacillus subtilis*, штамм DSM 5750. Минимальное содержание каждой бактерии $1,6 \times 10^9$ КОЕ/г. Пребиотический препарат «Кормомикс МОС» представляет собой комбинацию маннанолигосахаридов (МОС) и бета-глюканов, выделенных из клеточных стенок дрожжей. Состав препарата: глюканоманнаны – не менее 25 %, в т.ч. активированные маннанолигосахариды (МОС) до 8,0 %, β -глюканы – до 20 %, протеины – до 45 %, в т.ч. незаменимые свободные аминокислоты до 38 %, витамины группы В – до 640 мг/кг.

Первая группа – контроль (без препарата). Опытным животным ежедневно давали про- и пребиотические препараты согласно рекомендации производителя. Баранчикам II группы – пробиотический препарат «BioPlus YC» по 1 г на голову один раз в сутки вместе с ячменной дертью в течение 30 суток; III группы – совместно два препарата с ячменной дертью в течение 30 суток: пробиотический препарат «BioPlus YC» по 1 г на 1 голову в сутки и пребиотический препарат «Кормомикс-МОС» по 5 г на 1 голову в сутки.

Результаты исследований. Применение пробиотического препарата и совместное применение про- и пребиотического препаратов оказало положительное влияние на прирост живой массы животных (табл. 1). По окончании опыта, в возрасте 8 месяцев, превосходство животных II группы над контрольными по жи-

вой массе составило 2,54 кг, или 7,3 % ($P>0,99$), а III группы – 4,25 кг, или 12,2 % ($P>0,999$). Результаты опыта показали превосходство опытных животных над контрольными.

С целью изучения комплексного влияния используемых препаратов на мясную продуктивность по окончании опыта был произведен контрольный убой 3 баранчиков из каждой группы в возрасте 8 месяцев. Все отобранные животные по телосложению и упитанности были типичными для своих групп, их живая масса была максимально приближена к среднему значению по каждой группе. Результаты убоя представлены в табл. 2.

Данные табл. 2 показывают, что по всем изучаемым показателям опытные животные превосходили контрольных. Предубойная масса животных II группы была больше, чем у животных I группы, на 2,1 кг, или 5,9 % ($P>0,95$), убойная масса – на 1,59 кг, или 11,0 % ($P>0,95$). По массе охлажденных туш животные II группы превосходили сверстников I группы на 1,52 кг, или 10,8 % ($P>0,95$), по массе внутреннего жира – на 0,07 кг (с недостоверной разницей). Убойный выход во II опытной группе в среднем составил 43,09 % против 41,13 % в контрольной группе, что на 4,8 % больше.

Предубойная масса животных III группы была больше, чем у животных I группы, на 4,15 кг, или 11,8 % ($P>0,99$), убойная масса – на 3,35 кг, или 23,2 % ($P>0,99$). По массе охлажденных туш животные III группы превосходили сверстников I группы на 3,2 кг, или 22,8 % ($P>0,99$), по массе внутреннего жира – на 0,15 кг. Убойный выход в III опытной группе в среднем составил 45,31 % против 41,13 % в контрольной группе.

Следует отметить, что животные III группы превосходили достоверно не только животных контрольной группы, но и II опытной группы по предубойной и убойной массе. По остальным показателям достоверных различий не выявлено.

Заключение. Пробиотический препарат «BioPlus YC» и пробиотический препарат совместно с пребиотическим препаратом «Кормомикс-МОС», применяемые при выращивании баранчиков ставропольской породы, положительное влияют на их развитие и мясную продуктивность. По живой массе превосходство животных II группы над контролем составило 7,3 % ($P>0,99$), а III группы – 12,2 % ($P>0,999$).

Опытные животные обладали лучшими мясными качествами. По предубойной и убойной массе баранчики II и III групп достоверно превышали контрольных животных. По этим показателям животные III группы достоверно превосходили животных II группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюков О.И. Использование пробиотического препарата «Ветом 1.1» при выращивании молодняка овец // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2015. – № 3. – С. 24–26.
2. Блинов В.А., Ковалева С.В., Буришина С.Н. Пробиотики в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. – Саратов: Наука, 2011. – 171 с.
3. Использование микробиологических препаратов в кормлении молодняка крупного рогатого скота типа «Приобский» / Н.А. Ларина [и др.] // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2015. – № 10 (41). – С. 39–40.
4. Марченко В.В. Особенности продуктивности разных пород овец Ставропольского края // Аграрный научный журнал. – 2017. – № 8. – С. 14–17.

Таблица 1

Динамика живой массы баранчиков за период опыта

Группа	1 мес.	8 мес.	Абсолютный прирост, кг	Средне-суточный прирост, г	Относительный прирост, %
I	7,52±0,24	34,80±0,58	27,28	134,7	362,8
II	7,33±0,22	37,34±0,50	29,83	142,0	397,2
III	7,47±0,39	39,05±0,59	31,58	150,4	422,8

Таблица 2

Основные показатели мясной продуктивности баранчиков

Показатель	Группа		
	I	II	III
Предубойная масса, кг	35,16±0,39	37,25±0,44*	39,31±0,51**
Убойная масса, кг	14,46±0,30	16,05±0,39*	17,81±0,42**
Масса охлажденной туши, кг	14,04±0,31	15,56±0,44*	17,24±0,49**
Масса внутреннего жира, кг	0,42±0,02	0,49±0,06	0,57±0,05
Убойный выход, %	41,13	43,09	45,31

* $P\geq 0,95$; ** $P\geq 0,99$; *** $P\geq 0,999$.

5. Самаев И.Р., Бирюков О.И. Влияние пробиотического препарата «Био Плюс 2Б» на развитие и резистентность баранчиков // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2015. – № 3. – С. 26–27.

6. Самаев И.Р., Бирюков О.И. Применение пробиотических препаратов при выращивании баранчиков цигайской породы // Научная жизнь. – 2016. – № 4. – С. 154–163.

7. Самаев И.Р., Бирюков О.И. Продуктивность молодняка овец при использовании пробиотических препаратов «Био Плюс 2Б» и «Олин» баранчиков // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2017. – № 2. – С. 34–36

Самаева Ксения Алексеевна, аспирант кафедры «Технология производства и переработки продукции животноводства», Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова. Россия.

Бирюков Олег Игоревич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Технология производства и переработки продукции животноводства», Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова. Россия.

410005, г. Саратов, ул. Соколова, 335.

Тел.: (8452) 69-25-32; e-mail: biryukovoi@yandex.ru.

Ключевые слова: ягнята; живая масса; пробиотики; пребиотики; мясная продуктивность.

INFLUENCE OF THE PROBIOTIC PREPARATION "BIO PLUS YC" AND PREBIOTIC PREPARATION "KORMOMIX MOS" ON THE DEVELOPMENT AND MEAT PRODUCTIVITY OF STAVROPOL RAMS

Samaeva Ksenia Alekseevna, Post-graduate Student of the chair "Technology of Production and Processing of Livestock Products", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Biryukov Oleg Igrisovich, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the chair "Technology of Production and Processing of Livestock Products", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Key words: lambs; live weight; probiotics; prebiotics; meat production.

The results of using the probiotic preparation "BioPlus YC" and the prebiotic preparation "Kormomiks MOS" for growing ram's Stavropol breed up to 8 months of age are presented. Their positive influence on the growth of live weight and meat production has been established.

УДК 632.51:631.963

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ В АГРОФИТОЦЕНОЗАХ

СПИРИДОНОВ Юрий Яковлевич, Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

БУДЫНКОВ Николай Иванович, Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии

ДУДКИН Игорь Витальевич, Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства

СТРИЖКОВ Николай Иванович, ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

СУМИНОВА Наталья Борисовна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

НИКОЛАЙЧЕНКО Наталия Викторовна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

ДАУЛЕТОВ Махат Аскарбекович, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

ЛЕНОВИЧ Дарья Рудольфовна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Изучено взаимодействие культурных и сорных растений и вредителей в агрофитоценозе. Определены пороги вредоносности для обоснования рационального использования средств защиты растений. Установлены экономические пороги вредоносности вредных организмов, что служит научной основой для разработки эффективных мер борьбы с ними.

Введение. Современное сельское хозяйство невозможно представить без эффективного и рационального использования химических средств защиты растений (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов) [10–12, 15, 16]. Один из основных факторов, отрицательно влияющих на продуктивность сельскохозяйственных культур, – сор-

ные растения. В Поволжье ежегодные потери из-за сорняков достигают на зерновых культурах 30 %, на технических – 50 %, а в отдельные годы 90 % [1, 5, 6, 8].

Кроме того, серьезную угрозу урожайности полевых культур и их качеству представляет комплекс вредителей [2–4, 7, 9, 13, 14]. Для научного