УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ТИПОВ РОЖДЕНИЯ

ЕГОРОВА Карина Алексеевна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

МОЛЧАНОВ Алексей Вячеславович, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Представлены данные мясной продуктивности баранчиков эдильбаевской породы одиночного и двойного типа рождения. Исследования проводились в СПО «Камышинское» Камышинского района Волгоградской области. У животных опытных групп были изучены следующие показатели: живая масса, масса туши и внутреннего жира, масса курдюка, убойная масса, содержание мякоти, убойный выход и коэффициент мясности. Установлено, что производство баранины в убойной массе в расчете на одну овцематку при рождении баранчиков двойного типа рождения возрастает до 33,54 кг, или на 52,66 % больше, чем при рождении баранчиков-одиночек.

Введение. Эдильбаевская порода овец – одна из старейших аборигенных пород России. Благодаря высокой мясной продуктивности и хорошим адаптационным способностям получила широкое распространение в Поволжье [2, 4]. В настоящее время основная задача при разведении данной породы – получение молодой баранины и поярковой грубой шерсти [1].

Наряду с мясной продуктивностью при разведении овец не следует забывать о таком важном показателе, как многоплодие маток [5]. Это один из основных факторов увеличения производства молодой баранины, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности ведения овцеводства. Решение данной задачи возможно при увеличении выхода ягнят на одну овцематку. В качестве селекционного признака отбора для повышения многоплодия овец может быть использован тип их рождения [3].

Цель данной работы – изучение мясной продуктивности баранчиков эдильбаевской породы в зависимости от типа рождения.

Методика исследований. Экспериментальную работу проводили в СПО «Камышинское» Камышинского района Волгоградской области. Для этого были сформированы две группы баранчиков из одиночных и двойных пометов, по 30 голов в каждой. До 4-месячного возраста молодняк содержался совместно с овцематками. После проведения отбивки животные опытных групп находились на нагуле с подкормкой концентратами из расчета 200 г на 1 голову в сутки.

Контрольные убои проводили по методике ВИЖ (1978) в 4-месячном возрасте при отбивке от матерей и в 7-месячном возрасте по окончании эксперимента. Предубойную живую массу определяли путем взвешивания

животных после 24-часовой голодной диеты с точностью до 0,1 кг. Массу парной туши определяли путем взвешивания ее с почками и околопочечным жиром, убойную массу – путем взвешивания туши без учета почек и внутреннего жира. Убойный выход устанавливали расчетным методом путем отношения убойной массы к предубойной, выраженной в процентах.

Результаты исследований. В ходе исследований устанавливали убойные качества баранчиков разных типов рождения (см. таблицу).

По результатам контрольных убоев, баранчики из одиночных пометов превосходили своих сверстников из двойных пометов по убойной массе: в 4 месяца на 27,34 % ($P>0,999$), а в 7 месяцев на 31,01 % ($P>0,999$). Убойный выход также был несколько выше у баранчиков-одиночек, в 4 и 7 месяцев на 1,31 и 0,59 абс.% соответственно по сравнению с баранчиками из двойных пометов. Это говорит о том, что баранчики из одиночных пометов больше получали питательных веществ с момента рождения по сравнению с баранчиками из двойных пометов.

По выходу мякоти в туше можно судить о ее ценности. Нужно отметить, что у баранчиков, рожденных в одиночных и двойных пометах, достаточно высокий процент содержания мякоти, который с возрастом увеличивается. Это опять же доказывает высокий уровень мясной продуктивности эдильбаевской породы. Так, по выходу мякотной части туши в 4-месячном возрасте одиночные баранчики превосходили своих сверстников на 1,12 абс.%, а в 7 месяцев эта разница составила 0,89 абс.%.

Коэффициент мясности, характеризующий соотношение мышечной и костной ткани, в первой и во второй группах не имел особых раз-

Убойные качества баранчиков разных типов рождения

Показатель	Тип рождения	
	одиночный	двойневый
4 месяца		
Предубойная масса, кг	31,65±0,27	25,50±0,25
Масса туши, кг	14,28±0,14	11,40±0,15
Масса внутреннего жира, кг	0,64±0,06	0,41±0,03
Масса курдюка, кг	1,52±0,13	1,10±0,11
Убойная масса, кг	16,44±0,23	12,91±0,19
Убойный выход, %	51,94	50,63
Содержание мякоти, кг %	11,12±0,28	8,75±0,35
	77,87	76,75
Коэффициент мясности	3,51±0,11	3,30±0,09
Площадь мышечного глазка, см ²	9,3±0,15	8,1±0,12
7 месяцев		
Предубойная масса, кг	40,50±0,51	31,25±0,47
Масса туши, кг	18,21±0,32	13,98±0,22
Масса внутреннего жира, кг	0,79±0,07	0,62±0,06
Масса курдюка, кг	2,97±0,17	2,17±0,15
Убойная масса, кг	21,97±0,35	16,77±0,28
Убойный выход, %	54,25	53,66
Содержание мякоти, кг %	14,40±0,39	10,93±0,32
	79,07	78,18
Коэффициент мясности	3,77±0,13	3,58±0,12
Площадь мышечного глазка, см ²	13,5±0,19	11,8±0,17

личий. В 4-месячном возрасте у одиночных и двойневых баранчиков он равнялся 3,30–3,51, а в 7-месячном – 3,58–3,77.

Площадь мышечного глазка, являющаяся одним из важных показателей мясной продуктивности, у баранчиков одиночного типа рождения была больше по сравнению с животными двойневого типа рождения в 4 меся-

ца на 1,2 см² (12,9 %), а в 7 месяцев на 1,7 см² (12,5 %).

Закключение. В ходе исследований установлено, что баранчики-одиноцы росли и развивались более интенсивно по сравнению с двойневыми сверстниками, что предопределило и больший уровень их мясной продуктивности. Несмотря на это, производство баранины в убойной массе в расчете на одну овцематку возрастает до 33,54 кг (152,66 %) при рождении баранчиков в двойневом приплоде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курдючные овцы Калмыкии / А.Н. Арилов [и др.] // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2006. – № 1. – С. 26.
2. Лушников В.П., Молчанов А.В., Рамзов И.А. Мясная продуктивность баранчиков эдильбаевской породы разной масти с разной величиной курдюка // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2017. – № 4. – С. 22–23.
3. Лушников В.П., Молчанов А.В. Резервы производства баранины в Поволжье. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Науч. книга, 2010. – 128 с.
4. Марченко В.В. Особенности продуктивности разных пород овец Ставропольского края // Аграрный научный журнал. – 2017. – № 8. – С. 14–17.
5. Федоров Н.А., Ерохин А.И., Новиков Л.С. Романовское овцеводство. – М.: Агропромиздат, 1987. – 220 с.

Егорова Карина Алексеевна, аспирант кафедры «Технология производства и переработки продукции животноводства», Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова. Россия.

Молчанов Алексей Вячеславович, д-р с.-х. наук, проф., зав. кафедрой «Технология производства и переработки продукции животноводства», Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова. Россия.

410005, г. Саратов, ул. Соколова, 335.

Тел.: (8452) 69-23-46.

Ключевые слова: убойные показатели; тип рождения; одиночные; двойневые; эдильбаевская порода; баранчики.

SLAUGHTERING QUALITIES OF EDILBAEV RAM HOGS OF DIFFERENT BIRTH TYPES

Egorova Karina Alekseevna, Post-graduate Student of the chair "Technology of Production and Processing of Livestock Products", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Molchanov Alexey Vyacheslavovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the chair "Technology of Production and Processing of Livestock Products", Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov. Russia.

Keywords: slaughter indicators; type of birth; single ram hogs; double; Edilbaevskaya breed; ram hogs.

The article presents data on the slaughtering qualities of the rams of the Edilbaevskaya breed of different birth types. The research was carried out in the Kamyshtinskoe SPC of the Kamyshtinsky District of the Volgograd Region on single and double-type ram sheep. In animals of experimental groups such parameters as: live weight, weight of cooled carcass, weight of internal fat, weight of fattened fat, slaughter mass, content of pulp, on the basis of which slaughter yield and meat factor were calculated, were studied. Our studies show that the production of mutton in slaughter mass per sheep at the birth of ram-type double-bodied type of birth increases to 33.54 kg, or 52.66% more than at the birth of sheep's odds.